

Convegno Internazionale

GIORNATE INFETTIVOLOGICHE “LUIGI SACCO” 2018

MILANO, 14-15 GIUGNO 2018

OSPEDALE LUIGI SACCO POLO UNIVERSITARIO – ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

Anziani con comorbidità: aspetti organizzativi

Marino Faccini

Medicina Preventiva nelle Comunità Malattie infettive

Sistema Socio Sanitario




Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana


Soggetti cronici nella ATS della Città Metropolitana di Milano

Numero di residenti 2017: **3.447.542**



1 Patologia	≥ 2 Patologie
530.330	541.855


Prevalenza malattie croniche ATS Milano



Non è un paese per vecchi

- Forte raccomandazione per le vaccinazioni dei soggetti cronici
- Scarso successo dei programmi vaccinali
- Ridotto impatto sull'incidenza delle malattie infettive prevenibili nei soggetti a rischio

ATS Milano. Incidenza delle malattie invasive da
Pneumococco 2006 – 2017 per classe d'età



Come raggiungere i cronici

Strategie basate sull'età «age based». Hanno il vantaggio di individuare facilmente la popolazione target, favorendo la proposta vaccinale. Es. antiinfluenzale nei soggetti ≥ 65 anni, antipneumococco nei soggetti di 65 anni di età

Strategie basate sul rischio «risk based». Sono più appropriate in quanto rivolte a soggetti a rischio indipendentemente dall'età ma più difficili da realizzare per la difficoltà a raggiungere il target

Indovina chi?



Chi non dovrebbe vaccinarsi contro l'influenza?

adulto, in buona salute
normopeso
con test di gravidanza negativo
che non stia vicino a nessun soggetto a rischio
che non svolga una attività di pubblica utilità
non sia operatore sanitario
non faccia il veterinario
non allevi galline


CDC. Recommendations for the Use of Influenza Vaccines, 2017–18 Season.

Routine annual influenza vaccination is recommended for all persons aged ≥ 6 months who do not have contraindications

Chi vaccina i cronici

Vaccino	MMG (2017/2018)
Influenza $\geq$ 65 anni	305.678 (86,9%)
Influenza (soggetti a rischio < 65 anni)	37.473 (64,6%)
Pneumococco (soggetti a rischio + 65 enni)	13.715 (92.8%)

I vaccini nel percorso della presa in carico cronicità



Patologia	Vaccinazioni proposte
BPCO	Influenza, Pneumococco, Zoster (> 50 anni)
cardiopatia ischemica	Influenza, Pneumococco , Zoster (> 50 anni)
diabete tipo I	Influenza, Pneumococco , Meningococco ABCWY
diabete tipo II	Influenza, Pneumococco, Zoster (> 50 anni)
insufficienza renale cronica	Influenza, Pneumococco , Meningococco ABCWY, Epatite B, Varicella
scompenso cardiaco	Influenza, Pneumococco, Zoster (> 50 anni)
ipertensione arteriosa	Influenza, Pneumococco

Chi potrebbe vaccinare il cronico con successo?

Chi è più vicino al paziente

Grazie per l'attenzione

mfaccini@ats-milano